



Resumen de datos principales

- Todos los años en los Estados Unidos, los incendios domésticos matan a más de 2,500 personas y causan un estimado de \$6.9 billones en daños materiales.
- Los detectores de humo en funcionamiento reducen a la mitad el peligro de morir en un incendio en el hogar.
- Sólo una de cada tres familias norteamericanas tienen y practican un plan de escape de incendios.*
- Los afroamericanos tienden a ser desproporcionadamente afectados por los incendios domésticos. En promedio, representan el 20% de todas las muertes por incendio a pesar de que representan menos del 13% de la población.**
- Cada año se informan aproximadamente 365,500 incendios domésticos en los Estados Unidos.**
- La mayoría de los incendios domésticos por calefacción son causados por equipos de calefacción que se encuentran demasiado cerca de cosas que pueden quemarse fácilmente, como muebles tapizados, ropa, colchones o ropa de cama.*
- Los calefactores portátiles participaron en un tercio de todos los incendios por calefacción y cuatro de cada cinco muertes por incendios de calefacción en el hogar.*
- En promedio, siete norteamericanos mueren en incendios domésticos todos los días.*
- Casi el 50% de todos los incendios de origen eléctrico tienen que ver con el malfuncionamiento del equipo o la distribución eléctrica defectuosa (múltiples) o los accesorios de iluminación.*
- Casi los dos tercios de todas las muertes en incendios ocurren en hogares que no tienen detectores de humo o que tienen unidades que funcionan mal.
- Aproximadamente el 80% de las muertes por incendios domésticos están relacionados con la asfixia causada por la inhalación de humo venenoso.**
- Cocinar es la causa principal de incendios domésticos y de lesiones relacionadas con incendios domésticos, seguido de cerca por los equipos de calefacción del hogar. Fumar es la causa principal de todas las muertes en incendios domésticos.
- Dos de cada cinco incendios domésticos comienzan en la cocina.
- En promedio, el 57% de las muertes de niños por incendios afectan a niños de cuatro años o menores. En los niños menores de 15 meses, la exposición al humo y al fuego es la tercer causa principal de muerte, después de los accidentes de transporte y los ahogamientos.

Fuentes:

Asociación Nacional de Protección contra Incendios ** Administración de Incendios de EE.UU* Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor*